

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

Durante el uso y manejo de BINDER 100 CE utilice el equipo de protección adecuado: gorra impermeable, camisa de manga larga y overol de algodón, careta protectora o lentes de seguridad para químicos con protección hermética, mascarilla con filtro contra polvos, guantes y botas de neopreno. Una vez concluida la jornada laboral, deberá lavar el equipo de protección con agua limpia y jabón de manera separada de la ropa de uso común, y almacenarlo junto con el equipo de aplicación en un área fresca y bajo llave.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO:

"NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO".
"NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES".
"MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS".
"LÁVASE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS".
"NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN".
"NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO".
"LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO".
"AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PONGÁSE ROPA LIMPIA".
"NO SE INGIERA, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL".
"NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO".
"NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA".

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA.

PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de haber contacto con el producto, aplique los siguientes primeros auxilios. **Si fue ingerido:** NO INDUZCA EL VÓMITO ni introduzca nada por la boca. Si la víctima está consciente y alerta, lavar la boca con abundante agua limpia. **Si es inhalado:** retire al paciente del área contaminada y llévalo a un lugar ventilado. Si es necesario, dar respiración artificial por el personal capacitado, no dar respiración de boca a boca cuando la persona haya tragado producto o tenga contaminada la cara, utilice un dispositivo ambu (resucitador manual o bolsa autoinflable). **Contacto con los ojos:** enjuáguelos durante 15 minutos con agua limpia levantando los párpados de forma periódica. Llamar inmediatamente al médico. **Contacto con la piel:** retirar la ropa contaminada y lavar con abundante agua y jabón. Mantener al paciente en reposo y abrigado. Dar atención médica en caso de que la irritación persista.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO: Grupo químico: Piretroides.

Signos y síntomas de intoxicación: por contacto con los ojos puede ocasionar ligera irritación, comezón y enrojecimiento, por vía inhalatoria causa dolor de cabeza, mareo, alergia y dificultad para respirar, **su ingestión** provoca náusea, vómito, diarrea; **por vía dermal** causa enrojecimiento, hormigueo, ardor y comezón.

Tratamiento y antidoto: BINDER 100 CE no tiene antidoto específico, el tratamiento debe ser sintomático. El tratamiento de la exposición debe dirigirse al control de síntomas y condición clínica.

TELÉFONO DE EMERGENCIA: Asistencia médica las 24 horas del día, en caso de intoxicación con plaguicidas **Llame a SINTOX al 01 800 009 2800 y/o ATOX al 01 800 000 2869.**

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE:

"DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS."

"MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT."

"EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)."

"EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCAANO."

"REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPOSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN."

"ESTE PRODUCTO ES **EXTREMADAMENTE TÓXICO** PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES)."

"ESTE PRODUCTO ES **ALTAMENTE TÓXICO** PARA ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO."

USO AGRÍCOLA



BINDER®

bifentrina

Insecticida / Concentrado emulsionable

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

INGREDIENTE ACTIVO:

Bifentrina: 2-metil-3-fenilbencil-(1RS)-cis-3-(2-cloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato
(Equivalente a 100 g de i.a. /L a 20°C)

INGREDIENTES INERTES:

Emulsificantes y solvente.

NÚMERO DE REGISTRO: RSC0-INAC-0176-X0350-009-10.94



**Nocivo en caso de ingestión
Nocivo si se inhala**

FECHA DE ELABORACIÓN: Ver en el envase

LOTE NO: Ver en el envase

FECHA DE CADUCIDAD: 2 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE ELABORACIÓN

TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:

Rotam México, S.A. de C.V.
Avenida Vallarta No. 6503 Interior G14, Col. Ciudad Granja,
Zapopan C.P. 45010, Jalisco.
Tel: 01 33 3110 0888

HECHO EN CHINA

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS

INSTRUCCIONES DE USO

SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

BINDER 100 CE es un insecticida del grupo de los piretroides que actúa por contacto e ingestión. Se recomienda en aplicación al follaje en los cultivos aquí indicados y para el control de las siguientes plagas.

CULTIVO	PLAGAS	DOSIS	OBSERVACIONES
Calabacita (3) Calabaza (3) Melón (3) Pepino (3) Sandía (3) Chayote (3)	Mosquita blanca (<i>Bemisia tabaci</i>) Pulgón (<i>Aphis gossypii</i>)	0.4 - 0.6 L/ha	Hacer 2 aspersiones a intervalos de 7 días; volumen de aplicación 400 L de agua /ha.
Berenjena (7) Chile (7) Jitomate (1) Papa (3) Tomate de cáscara (1) Chile Bell (7)	Mosquita blanca (<i>Bemisia tabaci</i>) Pulgón Saltador (<i>Bacteriera cockerelli</i>)		Hacer 2 aspersiones al follaje a intervalos de 7 días; volumen de aplicación 350 – 400 L de agua/ha.

() INTERVALO DE SEGURIDAD: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

Periodo de reentrada al área tratada: Después de 24 horas de la aplicación del producto.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:

Durante la preparación y aplicación del producto, use siempre el equipo de protección personal descrito en el apartado de PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO. Para abrir el producto, gire la tapa del envase y rompa el sello de seguridad, procurando no entrar en contacto con el producto. En el equipo de aplicación llenar el tanque de la aspersora hasta 3/4 de su capacidad, posteriormente agregue BINDER 100 CE en la dosis recomendada y termine de llenar con agua mezclando perfectamente el contenido. Aplique inmediatamente después de preparar la mezcla y mantenga en constante agitación. La mezcla deberá ser aplicada el mismo día de su preparación. Se recomienda su aplicación en la etapa de floración y fructificación cuando se presenten los primeros individuos de la plaga."

CONTRAINDICACIONES: Evite aplicar BINDER 100 CE durante los periodos de alta temperatura (mayor a 28°C) y alta radiación. Para evitar el lavado o pérdida del producto no aplique cuando esté lloviendo o exista alta probabilidad de lluvia. No aplicar con vientos superiores a 10 km/h o cuando exista la presencia de rocío sobre el follaje. Aplicar a favor del viento.

FITOTOXICIDAD: BINDER 100 CE no es fitotóxico a las dosis y en los cultivos aquí indicados, si es aplicado de acuerdo a lo recomendado en esta etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD: Cuando se desconozca la compatibilidad de alguna mezcla de uso agrícola, deberá hacerse una prueba previa a su aplicación para evitar efectos fitotóxicos, solo se podrán hacer mezclas con productos que tengan registros vigentes en los cultivos recomendados en esta etiqueta.

MANEJO DE RESISTENCIA:

"PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL."

GARANTÍA

ROTAM MÉXICO, S.A. DE C.V., solo responde por el contenido neto y la formulación correcta de este producto. Como el almacenaje, transporte, manejo y aplicación están fuera de nuestro control, no nos hacemos responsables de los resultados que se obtengan del mismo, ya sea que se use o no de acuerdo a las instrucciones. Sin perjuicio de lo establecido en la Ley Federal de Protección al Consumidor.



PRECAUCIÓN

