ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:
Este producto es irritante a la piel, por lo que se recomienda el uso del siguiente equipo de protección para realizar las operaciones de manejo, preparación, mezcla y/o aplicación de este producto: mascarilla apropiada para polvos, lentes de protección, guantes y botas de hule, camisa de manga larga de algodón y pantalón de algodón, o trajes desechables de Tyvek. Posterior a la aplicación del producto teniendo aún puesto el equipo de protección indicado anteriormente, el equipo de aplicación deberá ser lavado y almacenado en un sitio seguro. Una vez que se termine esta actividad los trabajadores deberán bañarse y ponerse ropa limpia. El equipo de protección deberá ser lavado y almacenado en el lugar de trabajo.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO:
"NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO"
"NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS O ROPA"
"MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"
"LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS"
"NO SE INGIERA Y EVITE EL CONTACTO DEL PRODUCTO CON LOS OJOS Y LA PIEL"
"EN CASO DE PRESENTAR MOLESTIAS POR EL CONTACTO CON EL PRODUCTO, LLEVE A LA PERSONA CON EL MÉDICO"

PRIMEROS AUXILIOS:

Exposición dermal: En caso de contacto lave inmediatamente la piel expuesta con agua y jabón, quite la ropa contaminada y los zapatos inmediatamente, lavar esa ropa antes de volver a usarla. Obtener atención médica.
Exposición de ojos: En caso de contacto con los ojos, lave con bastante agua por al menos 15 minutos. Separando los párpados con los dedos para asegurar la salida del material. Si la irritación persiste obtenga atención médica.
Exposición inhalatoria: Si es inhalado, remueva al paciente a un área con aire fresco. Si se dificulta la respiración administre oxigeno. Si es necesario consiga atención médica.
Exposición oral: Si el producto es ingerido y la persona está consciente, lave inmediatamente la boca con abundante agua limpia. Consiga atención médica.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE:
"RESPETE LAS RECOMENDACIONES DE USO DEL PRODUCTO"
"MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN SU LOCALIDAD"
"RESPETE LAS BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS"
"NO TIRE LOS ENVASES O EMPAQUES VACÍOS DEL PRODUCTO EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA"
"NO VIERTA EL REMANENTE DEL PRODUCTO O AGUA DE LAVADO DEL EQUIPO DE APLICACIÓN, EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA"
"RESPETE LAS DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO"

USO AGRÍCOLA

ROTAM

HAIGLO®

Fertilizante Órgano-Mineral
Polvo

COMPOSICIÓN GARANTIZADA	% (p/p)
Materia Orgánica	45.0
Potasio (K_2O)	17.0

REGISTRO: RSCO-035/III/18

CONTENIDO NETO:
1Kgx10

Provoca irritación cutánea

FECHA DE ELABORACIÓN (AÑO/MES/DÍA):

LOTE NO:

FECHA DE CADUCIDAD: 2 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE ELABORACIÓN

TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:
Rotam México, S.A. de C.V.
Avenida Vallarta No. 6503 Interior G14, Col. Ciudad Granja,
Zapopan C.P. 45010, Jalisco.
Tel: 01 33 3110 0888

HECHO EN CHINA

" ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS AQUÍ RECOMENDADOS "

"INSTRUCCIONES DE USO"

SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

Haiglo® es un producto que está formulado a base de extracto de vegetales y potasio de fácil absorción y efecto rápido, que facilitan la nutrición; así como, activa las funciones bioquímicas en las células para acelerar la fotosíntesis lo que repercute en el crecimiento y desarrollo de las plantas favoreciendo la obtención de mejores cosechas. Se recomienda su aplicación en aspersión foliar, durante el ciclo del cultivo y cuando se presenten condiciones de estrés por frío, sequía y/o lluvia.

CULTIVO	DOSIS g/ha	RECOMENDACIONES
Chile, chile bell, jitomate, tomate de cáscara, tabaco, berenjena, melón, pepino, sandía, calabacita, calabaza, chayote, coliflor, brócoli.	200-400	Realizar 2-3 aplicaciones foliares, la primera hacerla antes de la floración y las posteriores con un intervalo de 10 días entre cada una.
Papa	200-400	Realizar 2-3 aplicaciones foliares, la primera a los 65 días después de la emergencia y las posteriores con intervalos de 20 días entre cada una.
Cebolla, poro, cebollin, col, lechuga, rábano	200-400	Realizar 3 aplicaciones foliares en desarrollo vegetativo, con intervalo de 10 días entre cada una, iniciando cuando la planta tenga 5-6 hojas verdaderas.
Ornamentales y viveros	200-400	Realizar 3 aplicaciones foliares en desarrollo vegetativo, con intervalo de 10 días entre cada una.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:
Durante el manejo y aplicación de este producto, siempre utilice su equipo de protección personal. Llenar el tanque de aplicación hasta ¾ partes de su capacidad con agua. Para abrir el envase por la parte superior con la ayuda de unas tijeras o un cúter. Pese la cantidad de producto a utilizar con una balanza. Agregar el producto a la dosis recomendada y agregar el agua restante hasta completar su capacidad y mantener en constante agitación. La mezcla deberá ser aplicada mismo día.

INCOMPATIBILIDAD:
Sólo deberá mezclarse con productos registrados en los cultivos autorizados, sin embargo cuando desconozca la compatibilidad de alguna mezcla, deberá hacerse una prueba previa a su aplicación.

AVISO DE GARANTÍA
Debido a que sale del alcance de **ROTAM MÉXICO, S.A. DE C.V.** la empresa no se hace responsable por el mal uso del producto ni por los daños que puedan causarse en caso de no cumplir con las recomendaciones señaladas en esta etiqueta.