

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

Durante la preparación, mezcla y aplicación del producto use: gorra impermeable, mascarilla contra polvos o mascarilla completa con cartucho respiratorio, guantes y botas de neopreno, camisa de manga larga de algodón, pantalón largo de algodón u overol de algodón, lentes de seguridad transparentes con protección hermética o careta facial protectora. Después de la jornada laboral lave la ropa de trabajo, el equipo de protección personal y el equipo de aplicación por separado de la ropa de uso común. La ropa y calzado utilizados deberán destinarse a este único fin y deben ser almacenados en el lugar de trabajo y bajo llave. El producto sobrante consérvelo en su envase original, manteniéndolo perfectamente cerrado y en un lugar fresco, seco y bajo llave. Los envases vacíos no deben ser reutilizados.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO:

- "NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO".
- "NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES".
- "MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS".
- "LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS".
- "NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN".
- "NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO".
- "LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO".
- "AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PONGÁSE ROPA LIMPIA".
- "NO SE INGERIA, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL".
- "NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO".
- "NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA".

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA.

PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de intoxicación, consiga inmediatamente atención médica, mientras tanto se deben aplicar los siguientes primeros auxilios:
Inhalación: Llevar al intoxicado a un área bien ventilada, con aire libre. Si no respira suministre respiración artificial por el personal capacitado y con las debidas precauciones a través de un dispositivo ambu (resucitador manual o bolsa autoinflable) evitando hacer contacto con el paciente. **Ingestión:** si el intoxicado sigue consciente suministrar uno o dos vasos de agua. En caso de que el paciente este inconsciente no administre nada por la boca. **NO** inducir el vómito, conseguir ayuda médica. **Ojos:** lavar de inmediato con abundante agua limpia por al menos 15 minutos, en caso necesario consiga ayuda medica. **Piel:** lavar el área afectada con jabón y abundante agua, quitar la ropa contaminada.

TELÉFONO DE EMERGENCIA: Asistencia médica las 24 horas del día, en caso de intoxicación con plaguicidas **Llame a SINTOX al 01 800 009 2800 y/o ATOX al 01 800 000 2869.**

RECOMENDACIONES AL MÉDICO:

Grupo químico: Este producto es un insecticida del grupo químico de los carbamatos.

Signos y síntomas de intoxicación: Los síntomas de intoxicación incluyen: **por vía inhalatoria:** dificultad para respirar, letargo; **por vía oral:** salivación, náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea; **por vía dermal:** sudoración; **por vía ocular:** puede causar irritación ocular.

Tratamiento y antídoto: Para uso médico exclusivamente: las personas que atienden a la víctima deben evitar el contacto directo con la ropa y los vómitos. En los casos en donde tenga que lavar la piel y el cabello use guantes de neopreno; los guantes de vinilo no brindan protección. Asegúrese de que exista una vía aérea despejada. Intubar al paciente y aspirar las secreciones con un dispositivo de succión de gran diámetro si es necesario. Administre oxígeno mediante ventilación pulmonar asistida mecánicamente si la respiración está deprimida. Mejore la oxigenación de los tejidos tanto como sea posible antes de administrar atropina, para minimizar el riesgo de fibrilación ventricular.

Administre sulfato de atropina por vía intravenosa, o intramuscular si no es posible la inyección intravenosa.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE:

"DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS."

"MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT."

"EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)."

"EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCAÑO."

"REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN."

CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA: ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES TERRESTRES DE SANGRE CALIENTE (MAMÍFEROS Y AVES).

ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS)

ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO.

USO AGRÍCOLA



metomilo

Insecticida / Concentrado Soluble

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

% EN PESO

INGREDIENTE ACTIVO:

Metomilo: S-metil (EZ)-N-(metilcarbamoilo)tiocacetimidato
(Equivalente a 216 g de metomilo /L a 20 °C)

23.43

INGREDIENTES INERTES:

Disolventes

76.57

TOTAL : 100.00

NÚMERO DE REGISTRO: RSCO-INAC-0146-X0430-375-23.43

CONTENIDO NETO:

1L



Mortal si se inhala

FECHA DE ELABORACIÓN: Ver en el envase

LOTE NO: Ver en el envase

FECHA DE CADUCIDAD: 2 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE ELABORACIÓN

TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:

Rotam México, S.A. de C.V.
Avenida Vallarta No. 6503 Interior G14, Col. Ciudad Granja,
Zapopan C.P. 45010, Jalisco.
Tel: 01 33 3110 0888

HECHO EN TAIWAN

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS

INSTRUCCIONES DE USO

SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

Kuik® LV es un insecticida que se recomienda para su uso en el cultivo y contra la plaga que se menciona a continuación.

CULTIVO	PLAGAS	DOSIS L/ha	OBSERVACIONES
Maíz (3)	Gusano Cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>)	0.75-1.0	Realizar una aplicación al follaje cuando se detecten los primeros individuos de la plaga.

() INTERVALO DE SEGURIDAD: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

Periodo de reentrada al área tratada: No permita la reentrada a las áreas tratadas hasta después de transcurridas 24 horas de aplicado el producto.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO Durante el manejo y aplicación de este producto siempre utilice el equipo de protección personal indicado en el apartado "Precauciones y advertencias de uso". Para abrir, gire la tapa en sentido contrario a las manecillas del reloj. Mida la cantidad necesaria de producto de acuerdo a la dosis recomendada con ayuda de una probeta. Llene el tanque de aplicación hasta ¾ partes de su capacidad con agua. Agregue el producto y agregue el agua del lavado al tanque, completar hasta su capacidad y mantener en constante agitación. La mezcla deberá ser aplicada al mismo día.

CONTRAINDICACIONES: No aplicar en horas de calor intenso, ni cuando la velocidad del viento sea mayor a 10 km/h. No aplique cuando llueva o exista amenaza de lluvia.

INCOMPATIBILIDAD: No se recomienda KUIK® LV en mezclas de tanque con otros agroquímicos. Si se desea mezclar, la mezcla se hará con productos registrados para el cultivo recomendado en esta etiqueta; sin embargo, es necesario realizar una prueba de compatibilidad y fitotoxicidad previa a la aplicación.

FITOTOXICIDAD: Este producto no es fitotóxico a la dosis y en el cultivo aquí indicado si es aplicado de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta.

MANEJO DE RESISTENCIA: "PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL".

GARANTÍA: ROTAM MÉXICO, S.A. DE C.V., solo responde por el contenido neto y la formulación correcta de este producto. Como el almacenaje, transporte, manejo y aplicación están fuera de nuestro control, no nos hacemos responsables de los resultados que se obtengan del mismo, ya sea que se use o no de acuerdo a las instrucciones. Sin perjuicio de lo establecido en la Ley Federal de Protección al Consumidor.



PELIGRO

