

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

L-システイン配合ビタミンC主薬製剤

チョコラBB[®]ルーセントC

第3類医薬品

チョコラBBルーセントCは、ビタミンC 600mgとL-システイン 240mgを配合し、表皮の下からメラニンが無色化していきます。ビタミンB₂・B₆配合で、肌の代謝(ターンオーバー)を正常化し、シミ、そばかすを緩和して本来のキレイな肌を取り戻していきます。

⚠ 使用上の注意



相談すること

- ①服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐

- ②服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

下痢

- ③1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- ④服用後、生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。出血が長く続く場合は、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

- 次の諸症状の緩和：しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着
- 次の場合のビタミンCの補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期
- 次の場合の出血予防：歯ぐきからの出血、鼻出血

「ただし、上記1および3の症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師又は歯科医師に相談すること。」

用法・用量

次の量を食前又は食後に水またはお湯で服用してください。

年齢	1回量	服用回数
成人(15歳以上)	2錠	1日3回
7歳以上15歳未満	1錠	
7歳未満	服用しないこと	

[用法・用量に関連する注意]

小児(7歳以上15歳未満)に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分と働き、保管及び取扱い上の注意については裏面をご覧ください。

成分と働き

成人1日量6錠中に次の成分を含みます。

成分	含量	働き
アスコルビン酸 (ビタミンC)	600mg	メラニン色素の生成を抑えて、 色素沈着を改善します。
L-システイン	240mg	
リボフラビンリン酸エステルナトリウム (ビタミンB ₂ リン酸エステル)	15mg	皮膚や粘膜の健康維持に働きます。
ピリドキシン塩酸塩 (ビタミンB ₆)	20mg	
ニコチン酸アミド	25mg	
コハク酸d- α -トコフェロール (天然型ビタミンE)	100mg	血行を促進して、新陳代謝を 高めます。

[添加物]

タルク、ヒドロキシプロピルセルロース、酸化チタン、ステアリン酸Mg、セルロース、ヒプロメロース、マクロゴール

[成分に関連する注意]

- ① ビタミンCの服用により、尿及び大便の検査値に影響をおよぼすことがありますので、尿及び大便の検査を受ける場合には、本剤を服用していることを医師にお知らせください。
- ② 本剤の服用により、尿が黄色くなることがあります。これは本剤に含まれているビタミンB₂が吸収され、その一部が尿中に排泄されるため心配はありません。

保管及び取扱い上の注意

- ① 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- ② 小児の手の届かない所に保管してください。
- ③ 他の容器に入れ替えないでください。また、本容器内に他の薬剤等を入れないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- ④ 湿気により錠剤の外観が変化するおそれがありますので、ぬれた手で触れないでください。
- ⑤ 容器内の詰め物は、輸送中の錠剤破損防止用です。容器のキャップを開けた後は捨ててください。
- ⑥ 容器内に乾燥剤が入っています。服用しないでください。
- ⑦ 使用期限をすぎた製品は使用しないでください。
- ⑧ 使用期限内であっても一度容器のキャップを開けた後は、品質保持の点から6ヵ月以内を目安に使用してください。箱の内ブタの「開封年月日」欄に、開封日を記入してください。

本品についてのお問い合わせ先

- お買い求めのお店
- エーザイ「hhcホットライン」 **フリーダイヤル 0120-161-454**
受付時間/平日9:00~18:00(土・日・祝日9:00~17:00) 携帯電話やPHSからもお問い合わせできます。



チョコラBBルーセントCの製品内容は
ホームページでも紹介しています。

chocola.com

発売元



エーザイ株式会社
東京都文京区小石川4-6-10

製造販売元



日東薬品工業株式会社
京都府向日市上植野町南開35-3