

本製品は日本国法に基づき製造販売されたものです。
製品および文書は日本国外の法規に準じているわけではありません。
本文書は、日本語の製品情報を翻訳した文書です。使用前に必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。
由於本產品是根據日本國家法律所製造銷售的產品，因此產品和文件內容不一定會遵守日本國以外的法律規定。
本文件是將日文的產品資訊譯成中文以供您參考，請務必在使用時閱讀。
請妥善保管以便在日後需要時隨時查閱。



從預防到治療
Eisai.jp

日用品

除去病毒、病菌，抗菌作用持續 24 小時

イータック®抗菌化スプレー

Etak Antibacterial Spray

- 配戴口罩前噴霧，可以 24 小時防止病毒和病菌附著於口罩。
- 主要成分為持續型抗菌成份 Etak（イータック），會固定於噴灑處持續長時間抗菌作用。
- Etak（イータック）是由廣島大學研究所醫齒藥保健學研究院的三川浩樹教授所開發的專利成分。（專利號碼：4830075）
- 1 瓶大約可按壓使用 230 次。

※並非對所有的病毒、病菌都有效。

※根據使用狀況，持續效力不同。

※效果僅限於噴霧溶液附著部分。

※本產品不屬於醫藥品或醫藥部外品。

※本產品不使用噴霧用氣體，丟棄時不需鑽孔。




包裝	建議零售價（含稅）
20 ml	1,166 日圓

特色

只需要噴灑在口罩上，持續型抗菌成份 Etak 便可 24 小時防止病毒和病菌附著。

※本產品不屬於醫藥品或醫藥部外品。

使用方法



將噴霧口朝向口罩，分別從口罩內外側距離約 10 cm 處均勻適量地噴按（3~4 次）。

- 剛開始使用本產品時，請空按數次。
- 請輕搖噴霧後的口罩，將其充分乾燥後再使用。
- 如果擔心會褪色或留下斑點，請在不顯眼處先試噴後再使用。
- 請勿將本產品倒置使用。
- 請勿在配戴口罩下噴霧。

遠離火源

成分

乙醇、乙氧基矽烷化合物、其他



使用上的注意事項

- 皮膚出現異常時請勿使用。
- 如果在使用過程中感到不適或出現發紅、腫脹、發癢、刺激（皮膚、鼻子、喉嚨）等異常情況，請停止使用。
- 請留意勿使藥液進入眼部。萬一進入眼睛時切勿揉眼，請用水或溫水徹底沖洗，並諮詢醫師。
- 不可飲用。萬一進到口內時，請喝水加以吐出，並諮詢醫師。
- 讓兒童使用時，請在家長的指導監督下進行。
- 請遵守口罩的使用方法，切勿重複佩戴相同口罩。
- 請勿使用於其他用途。
- 請勿在靠近火源或高溫處使用。
- 使用時請充分地進行通風換氣。
- 請小心勿吸入噴霧。
- 請勿在配戴未完全乾燥的口罩下駕駛操作交通工具或機械類，以及進行危險的作業等。
- 附著於建材或家具時，請立即擦拭。



保管上的注意事項

- 不使用時請蓋好蓋子。
- 請置於常溫下保管。請勿保管於陽光直射處。
- 請保管於兒童拿不到的地方。
- 請勿重新填充到其他容器中。
- 請勿保管於靠近火源或高溫處。

諮詢服務：若對本品有不清楚之處，請填寫諮詢表。依諮詢內容等因素，可能需要一段時間處理，但我們將儘速向您回覆。

諮詢表（僅有英語版）：https://inquiry.eisai.co.jp/webapp/form/17672_sdab_2/index.do