

肩こりに伴う **肩の痛み、腰痛、関節痛、筋肉痛**

第2類医薬品

Eisai

ナボリン®


〔日本薬局方 フェルビナクテープ〕

フェルビナク70


貼り方

※患部が汗などで
ぬれている場合は
よくふきます。


※貼り終わったら、
テープを上から
しっかりおさえて
ください。




中央のフィルムをはがして
ください。



中央部のみ患部へ貼り、
固定してください。



片方のフィルムをはがし
ながら貼ってください。



残ったフィルムをはがし
ながら貼ってください。

はがし方

※はがれにくい時は、
右図の方法をお試し
ください。



濡らせて
ゆっくり
はがす
水やぬるま湯で濡らせて
からはがします。



くるくると
巻き取る
くるくると巻きながら
はがします。

知って得する!

肩こりに伴う肩の痛みや腰痛の
対処法などを紹介しています!

Webで検索

ナボリン倶楽部

検索

nabolin.com

〈切り取り線〉 ✂

開封後はチャックを閉めて保管してください。

〔日本薬局方 フェルビナクテープ〕
販売名：ナボリン フェルビナク70

ご使用に際して、この袋の説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第2類
医薬品

10枚入

ナボリン® フェルビナク70

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

〔守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる〕

1. 次の人は使用しないでください。

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等）を起こしたことがある人
- (2) ぜんそくを起こしたことがある人
- (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人

2. 次の部位には使用しないでください。

- (1) 目の周囲、粘膜等
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口
- (3) みずむし、たむし等又は化膿している患部

3. 連続して2週間以上使用しないでください。

🗨 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、はれ、かゆみ、ヒリヒリ感、かぶれ等

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれます。

3. 5～6日間使用しても症状がよくなりえない場合は使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎（手・手首・足首の痛みと腫れ）、肘の痛み（テニス肘など）、打撲、捻挫

用法・用量

年 齢	使用方法
15歳以上	1日2回を限度として患部に貼付する。
15歳未満	使用しないこと

【用法・用量に関連する注意】

- (1) 定められた用法・用量を遵守してください。
- (2) 本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤なので、症状がある場合だけ使用してください。
- (3) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の薄片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
- (4) 患部が汗等でぬれているときは、よくふき取ってから使用してください。
- (5) 15歳未満の小児には使用しないでください。

成分（膏体100g中）

成 分	含 量	働 き
フェルビナク	5.0g	炎症を抑え、痛みをやわらげます。

添加物として、ゴムラテックス、ジイソプロパノールアミン、BHT、1-メントール、流動パラフィン、SBR合成ラテックス、オレイン酸ソルビタン、クロタミトン、1,3-ブチレンジオール、ポリブテン、メタクリル酸・アクリル酸ブチルコポリマーを含有します。

〔1枚あたり（10cm×14cm）フェルビナク70mg含有〕

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
また、本容器内に他の薬剤等を入れないでください。
（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (4) 未使用分は袋のチャックをしっかりと閉めて保管してください。
- (5) 使用期限をすぎた製品は使用しないでください。

製造販売元 発売元
救急薬品工業株式会社 エーザイ株式会社
富山県射水市戸破32-7 東京都文京区小石川4-6-10

本品に関するお問い合わせは、
エーザイ「hhcホットライン」へ ☎ 0120-161-454
nabolin.com

使用期限
（西暦 年/月）

製造番号



紙
PE,金属

M16K