

saclon

サクロン (顆粒)

第2類醫藥品



<

サクロンブランド情報

製品詳細・添付文書

+

overview

產品概要

サクロン®

令胃部變得暢快的綠色胃藥。迅速舒緩想吐、噁心及胃痛

胃部想吐及胸口灼熱是由於胃酸過多所致。

此外，因飲酒過量而令酒精直接刺激胃部黏膜，亦是原因之一。

サクロン錠能減弱（中和）胃酸過多，抑制其分泌，由葉綠素所製成的綠色成分能修復及保護受傷的胃黏膜。

適合胃部想吐及痛楚加劇等的人、或早上刷牙時會作嘔的人。立刻服用サクロン錠，輕鬆見效。

療效或效果

用法及用量

成分

注意事項

包裝及價格

▽

療效或效果



胸口灼熱、飲酒過量、胃痛、胃酸過多、腹脹、胃部不適、胃部膨脹感、胃部沉重感、胸口悶氣、噯氣、噁心（想吐、宿醉或醉酒時想吐、作嘔、噁心）、嘔吐

用法及用量

請將下列的量於空腹時（在餐間或臨睡前），用水或溫水服用。

年齡	1次用量	服用次數
成人（15歲以上）	1包	1天3次
8歲以上未滿15歲	1/2包	1天3次
未滿8歲	請勿服用	-

※餐間是指餐後超過兩小時，胃中的食物已幾乎被消化完的時候。

用法及用量相關的注意事項

用法及用量相關的注意事項

成分

成分與主要作用

成人1日分量3包（3.84g）中含有下列成分。

成分	含量	主要作用
銅葉綠素鈉	120mg	修復及保護受傷的胃黏膜。
磷酸氫鈣	1,020mg	直接中和分泌過多的胃酸。
沉澱碳酸鈣	1,020mg	直接中和分泌過多的胃酸。
氫氧化鎂	960mg	直接中和分泌過多的胃酸。
東莨菪萃取物	30mg	抑制胃酸分泌，止痛。

添加劑

玉米澱粉、羥丙基纖維素、l-薄荷醇、香料、氯化鉀、肉桂、硬脂酸鎂、聚維酮

成分相關的注意事項

1. 服用後，大便有可能會呈現綠色。這是由於銅葉綠素鈉被排泄時的染色。不用擔心。
2. サクロン錠，沒有使用含有鋁成分的物质。

注意事項

▲ 使用上的注意事項

禁止事項

[若不遵守，現在的症狀會惡化，或者容易引發副作用]

1. 服用本藥劑的期間，請勿服用下列任何一種醫藥品。
腸胃鎮痛鎮痙攣藥
2. 哺乳中的人請勿服用本藥劑，或在服用本藥劑時避免哺乳。
(轉移至母乳可能會引起嬰兒脈搏加快)

諮詢事項

1. 下列的人於服用前，請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。

1. 正接受醫師治療的人
2. 孕婦或可能懷孕的人
3. 年長者
4. 曾因藥品等，引發過敏症狀的人
5. 有下列症狀的人
排尿困難
6. 接受過下列診斷的人
腎臟病、心臟病、青光眼、甲狀腺功能障礙

2. 服用後，出現下列症狀的情況下，有可能是副作用，請立刻停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。

相關部位	症狀
皮膚	發疹、發紅、發癢

3. 服用後，可能出現下列症狀，這種症狀持續或變嚴重的情況下，請停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。

口乾、便秘、腹瀉

4. 即使服用2週左右，症狀也沒有改善的情況下，請停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。

其他注意事項

有可能令母乳分泌困難

保管及使用上的注意事項

1. 請保管於陽光直射不到、濕氣少的陰涼處。
2. 請保管於兒童拿不到的地方。
3. 請勿換裝於其他容器。而且，請勿在本容器內放入其他藥劑。（可能導致誤用或變質。）
4. 服用1包餘下的藥劑時，請將包裝袋口摺好，然後保管。超過兩日的情況下，請勿服用。
5. 請勿服用已超過使用期限的產品。

包裝及價格

包裝	建議零售價
10包	含稅：1,078日圓（不含稅：980日圓）
20包	含稅：2,046日圓（不含稅：1,860日圓）
32包	含稅：3,113日圓（不含稅：2,830日圓）