

saclo n q

サクロンQ

第2類醫藥品



<

サクロンブランド情報

製品詳細・添付文書

+

overview

產品概要

サクロンQ



阻隔末梢神經的傳遞。迅速舒緩想吐、噁心及胃痛

サクロンQ是能迅速舒緩因胃酸及酒精等刺激胃黏膜而引起的「想吐、噁心及胃痛」的胃藥。
藥劑為快速配方，服用後能迅速在胃中溶解，成分（Oxethazaine）能直接於胃黏膜發揮功效，迅速改善症狀。
感到胃痛等情況下，可隨時服用。
（1天最多3次、相隔4小時以上。）

療效或效果

用法及用量

成分

注意事項

包裝及價格

療效或效果



胃痛、腹痛、噁心（想吐、宿醉或醉酒時想吐、作嘔、噁心）、嘔吐、腹部突然劇痛（腹絞痛、胸腹疼痛）、胸口灼熱、胃酸過多、胃部不適、噯氣

用法及用量

請將下列的量用水或溫水服用。

年齡	1次用量	服用次數
成人（15歲以上）	2錠	1天最多3次
兒童（未滿15歲）	請勿服用	-

請相隔4小時以上服用。

用法及用量相關的注意事項

請不要嚼碎，直接吞服。（因為是迅速溶解的錠劑，成分在口中散開時，會令口內麻痺。）

取出錠劑的方法

請用指尖用力按壓放有錠劑的包裝膜凸出部位，將裏面的鋁箔弄破，然後取出錠劑服用。（有可能會引致誤將包裝膜吞服而令食道粘膜刺穿等的事故。）

成分

成分與主要作用

成人1次分量2錠中含有下列成分。

成分	含量	主要作用
Oxethazaine	5mg	直接於胃黏膜發揮功效，阻隔引起胃痛及嘔心等的刺激。

添加劑

玉米澱粉、D-甘露醇、硬脂酸鈣、纖維素

注意事項

▲ 使用上的注意事項

禁止事項

[若不遵守，現在的症狀會惡化，或者容易引發副作用]

1. 下列的人請勿服用
 1. 孕婦或可能懷孕的人
 2. 未滿15歲的兒童
2. 服用本藥劑的期間，請勿服用下列任何一種醫藥品。
其他腸胃藥（含有東莨菪萃取物的藥劑），其他腸胃鎮痛鎮痙攣藥
3. 請勿長期連續服用

諮詢事項

1. 下列的人於服用前，請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。
 1. 正在接受醫師治療的人
 2. 年長者
 3. 曾因藥品等，引發過敏症狀的人
2. 服用後，出現下列症狀的情況下，有可能是副作用，請立刻停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。

相關部位	症狀
皮膚	發疹、發紅、發癢
精神神經系統	頭痛、嗜睡、頭暈、全身乏力

3. 服用後，可能出現下列症狀，這種症狀持續或變嚴重的情況下，請停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。

便秘

4. 即使服用5~6次，症狀也沒有改善的情況下，請停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。

保管及使用上的注意事項

1. 請保管於陽光直射不到、濕氣少的陰涼處。
2. 請保管於兒童拿不到的地方。
3. 請勿換裝於其他容器。而且，請勿在本容器內放入其他藥劑。（可能導致誤用或變質。）
4. 請勿服用已超過使用期限的產品。

包裝及價格

包裝	建議零售價
6錠	含稅：748日圓（不含稅：680日圓）
12錠	含稅：1,408日圓（不含稅：1,280日圓）