

saclo n q

サクロンQ

第2类医药品



<

サクロンブランド情報

製品詳細・添付文書

+

overview

产品概要

# サクロンQ

セルフメディケーション  
税 控除 対象

阻断末梢神经传递。可对想吐、恶心、胃痛能迅速起效

サクロンQ是对因胃酸、酒精等刺激胃粘膜而引起的“想吐、恶心、胃痛”能快速起效的胃药。因为是一款服用后能快速溶解的速溶制剂，所以能在胃中马上溶解，其成分（奥昔卡因）会直接作用于胃粘膜，快速改善不适症状。

感觉胃部疼痛时可随时服用。

（1日服用不超过3次，每次服用需间隔4小时以上）

效能或效果

用法及用量

成分

注意事项

包装及价格

效能或效果



胃痛、腹痛、恶心（想吐、反胃、宿醉・醉酒想吐、作吐、恶心），呕吐、绞痛（疝痛）、烧心、胃酸过多、胃部不适、打嗝

用法及用量

请用水或温水服用下述量

年龄	1次剂量	服用次数
成人（15岁以上）	2片	1日不超过3次
儿童（未满15岁）	请勿服用	-

每次服用请间隔4小时以上

#### 用法及用量相关注意

请不要咀嚼，立即吞下药剂。（本药剂为快速溶解的片剂，如果成分扩散在口腔内，口腔中会残留麻木感。）

#### 如何取出药片

用指尖用力按压装有药片的纸的凸起部分，挤破背面的铝箔，取出药片并将其服用。（如果不小心把纸板也一起吞进去的话，会导致食道粘膜被刺伤而引发意外的事故。）

## 成分

#### 成分和作用

成人1次的量2片中含有下述成分。

成分	含量	药理作用
奥昔卡因	5毫克	直接作用于胃粘膜，阻断胃痛、恶心等的刺激。

#### 添加剂

玉米淀粉、D-甘露醇、硬脂酸钙、纤维素

## 注意事项

#### ▲ 使用注意事项

#### 禁止事项

若不遵守则会导致当前病情恶化，或容易出现副作用及事故

- 以下人群请勿服用。
  - 孕妇或有其可能性的人群
  - 未满15岁的儿童
- 在服用本药剂期间，请不要服用下述任何医药品。  
其他胃肠药（含有莨菪提取物的制剂）、其他胃肠镇痛解痉药
- 请勿长期连续服用。

#### 咨询事项

- 以下人群在服用前应咨询医师、药剂师或登录贩卖者。
  - 正在接受医师治疗的人群
  - 老年人
  - 因药物等出现过过敏症状的人群
- 服用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时应立即中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者

相关部位	症状
皮肤	皮疹・发红、发痒
精神神经系统	头痛、困倦、头晕、无力

3. 服用后可能出现下述症状，若症状持续或加重时应立即停止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者。

便秘

4. 若服用5~6次后症状仍无好转则应停止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者。

#### 保管及使用注意事项

1. 请保管在避免阳光直射的干燥阴凉场所。
2. 请保管在儿童无法触及的地方。
3. 请不要移至其他容器中。此外，请不要将其他药剂放入本容器中。（会导致误服或变质。）
4. 请勿使用超过使用期限的产品。

#### 包装及价格

包装	建议零售价
6片	含税：748日元（不含税：680日元）
12片	含税：1,408日元（不含税：1,280日元）