

saclo n s

サクロンS（顆粒）

第2類醫藥品



<

サクロンブランド情報

製品詳細・添付文書

+

overview

產品概要

サクロン[®]S

令胃部變得暢快的綠色胃藥。迅速舒緩胃痛、胸口灼熱及飲酒過量

サクロンS能消除早上起床時及上班時的「胃痛」「胸口灼熱」「想吐」等症狀，是容易服用的顆粒劑胃藥。

サクロンS能迅速抑制分泌過多的胃酸，消除胃部不適的症狀。此外，由葉綠素所製成的綠色成分能修復及保護因酒精或胃酸而受傷的胃黏膜。

適合早上起床時有胃痛或飲酒後有胸口灼熱及想吐的人。服用後，輕鬆見效。

効能・効果

▽用法・用量

▽成分

▽注意事項

▽包装・価格

▽

療效或效果



胃痛、胸口灼熱、飲酒過多、胃酸過多、腹脹、胃部不適、胃部膨脹感、胃部沉重感、胸口悶氣、噯氣、噁心（想吐、宿醉或醉酒時想吐、作嘔、噁心）、嘔吐

用法及用量

請將下列的量於空腹時（在餐間或臨睡前），用水或溫水服用。

年齡	1次用量	服用次數
成人（15歲以上）	1包	1天3次
8歲以上未滿15歲	1/2包	1天3次
未滿8歲	請勿服用	-

※餐間是指餐後超過兩小時，胃中的食物已幾乎被消化完的時候。

用法及用量相關的注意事項

使兒童（8歲以上未滿15歲）服用的情況下，請在家長的指導監督下使其服用。

成分

成分與主要作用

成人1日分量3包（3.84g）中含有下列成分。

成分	含量	主要作用
銅葉綠素鈉	90mg	修復及保護受傷的胃黏膜。
氫氧化鎂	1,050mg	直接中和分泌過多的胃酸。
沉澱碳酸鈣	1,650mg	直接中和分泌過多的胃酸。
東莨菪萃取物	30mg	抑制胃酸分泌，止痛。

添加劑

玉米澱粉、部分預膠化澱粉、L-薄荷醇、香料、氯化鉀、肉桂、聚乙烯吡咯烷酮

成分相關的注意事項

1. 服用後，大便有可能會呈現綠色。這是由於銅葉綠素鈉被排泄時的染色。不用擔心。
2. サクロンS，沒有使用含有鋁成分的物质。

注意事項

▲ 使用上的注意事項

禁止事項

[若不遵守，現在的症狀會惡化，或者容易引發副作用]

1. 服用本藥劑的期間，請勿服用下列任何一種醫藥品。
腸胃鎮痛鎮痙攣藥
2. 哺乳中的人請勿服用本藥劑，或在服用本藥劑時避免哺乳。
(轉移至母乳可能會引起嬰兒脈搏加快)

諮詢事項

1. 下列的人於服用前，請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。
 1. 正接受醫師治療的人
 2. 孕婦或可能懷孕的人
 3. 年長者
 4. 曾因藥品等，引發過敏症狀的人
 5. 有下列症狀的人
排尿困難
 6. 接受過下列診斷的人
腎臟病、心臟病、青光眼、甲狀腺功能障礙
2. 服用後，出現下列症狀的情況下，有可能是副作用，請立刻停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。

相關部位	症狀
皮膚	發疹、發紅、發癢

3. 服用後，可能出現下列症狀，這種症狀持續或變嚴重的情況下，請停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。
口乾、便秘、腹瀉
4. 即使服用2週左右，症狀也沒有改善的情況下，請停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。

其他注意事項

有可能令母乳分泌困難

保管及使用上的注意事項

1. 請保管於陽光直射不到、濕氣少的陰涼處。
2. 請保管於兒童拿不到的地方。
3. 請勿換裝於其他容器。而且，請勿在本容器內放入其他藥劑。(可能導致誤用或變質。)
4. 服用1包餘下的藥劑時，請將包裝袋口摺好，然後保管。超過兩日的情況下，請勿服用。
5. 請勿服用已超過使用期限的產品。

包裝及價格

包裝	建議零售價
34包	含稅：3,058日圓 (不含稅：2,780日圓)