

saclo n s

# サクロンS（顆粒）

第2类医药品



<

サクロンブランド情報

製品詳細・添付文書

+

overview

## 产品概要

# サクロン<sup>®</sup>S

让胃舒爽的绿色胃药。用于想吐、烧心、饮酒过度

サクロンS是一种易于饮用的颗粒型绿色胃药，可以消除您在晨起时或工作中感到的”胃痛”、“烧心”、“想吐”等症状。サクロンS通过快速抑制分泌过量的胃酸来消除不适的胃部症状。通过由叶绿素制作成的绿色成分可以修复和保护胃粘膜的损伤。

适用于晨起时感觉胃痛的人士，或一喝酒就感觉烧心想吐的人士。服用后还您一个舒爽的胃。

效能或效果

用法及用量

成分

注意事项

包装及价格

## 效能或效果



胃痛、烧心、饮酒过量、胃酸过多、胃胀、胃部不适感、胃部胀满感、胃重、胸闷、打嗝、恶心（想吐、反胃、宿醉・醉酒想吐、作吐、恶心）、呕吐

## 用法及用量

请在餐间及睡前空腹时用水或温水服用下述量。

| 年龄        | 1次剂量 | 服用次数 |
|-----------|------|------|
| 成人（15岁以上） | 1包   | 1日3次 |
| 8岁以上未满15岁 | 1/2包 | 1日3次 |
| 未满8岁      | 请勿服用 | -    |

※餐间是指进餐后2个小时左右，胃内几乎没有食物时。

### 用法及用量相关注意

儿童（8岁以上未满15岁）请在监护人指导监督下服用。

## 成分

### 成分及作用

成人1日量3包（3.69克）中含有下述成分。

| 成分     | 含量      | 药理作用         |
|--------|---------|--------------|
| 叶绿素铜钾  | 90毫克    | 修复及保护损伤的胃粘膜。 |
| 无水磷酸氢钙 | 1,050毫克 | 直接中和分泌过量的胃酸。 |
| 沉淀碳酸钙  | 1,650毫克 | 直接中和分泌过量的胃酸。 |
| 莨菪提取物  | 30毫克    | 抑制胃酸分泌，止痛。   |

### 添加剂

玉米淀粉、部分预糊化淀粉、L-薄荷醇、香料、氯化钾、肉桂、聚维酮

### 成分相关注意事项

1. 服用后，粪便可能会变成绿色，这是叶绿素铜钾（绿色）被排泄引起的着色，请不必担心。
2. サクロンS中未使用含铝的成分。

## 注意事项

### ▲ 使用注意事项

#### 禁止事项

若不遵守则会导致当前病情恶化，或容易出现副作用及事故

1. 在服用本药剂期间，请不要服用下述医药品。  
胃肠镇痛解痉药
2. 处于哺乳期时不要服用本药剂，或在服用本药剂时不要进行哺乳。  
(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります。)

#### 咨询事项

1. 以下人群在服用前应咨询医师，药剂师或登录贩卖者。
  1. 正在接受医师治疗的人群
  2. 孕妇或有其可能性的人群
  3. 老年人
  4. 因药物等出现过过敏症状的人群
  5. 拥有以下症状的人群  
排尿困难
  6. 接受以下诊断的人群  
肾病、心脏病、青光眼、甲状腺功能障碍
2. 服用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时应立即中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者

| 相关部位 | 症状       |
|------|----------|
| 皮肤   | 起疹・发红、发痒 |

3. 服用后可能出现下述症状，若症状持续或加重时应立即停止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者。  
口腔干燥、便秘、腹泻
4. 若服用2周后症状仍无好转，应停止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者。

#### 其他注意事项

可能导致难以产生母乳。

#### 保管及使用注意事项

1. 请保管在避免阳光直射的干燥阴凉场所。
2. 请保管在儿童无法触及的地方。
3. 请不要移至其他容器中。此外，请不要将其他药剂放入本容器中。(会导致误服或变质。)
4. 如需服用1包分服后剩余药物时，请将袋口折叠进行保管，当超过2天后请勿服用。
5. 请勿使用超过使用期限的产品。

#### 包装及价格

| 包装  | 建议零售价                    |
|-----|--------------------------|
| 34包 | 含税：3,058日元 (不含税：2,780日元) |