

saclo n q tablets

サクロン錠

第2类医药品



<

サクロンブランド情報

製品詳細・添付文書

+

overview

产品概要

サクロン錠

让胃舒爽的绿色胃药。用于想吐、烧心、饮酒过量

胃部的想吐、烧心的症状可能是由于胃酸分泌过多所引起的。另外，因过量饮酒而造成酒精对胃粘膜本身的刺激也是引起的原因之一。

サクロン錠可以减弱（中和）过量的胃酸作用，抑制其分泌，通过由叶绿素制作成的绿色成分可以修复和保护胃粘膜的损伤。

适用会出现胃部想吐、有锐痛症状的人士，或者在早上、刷牙时会出现恶心想吐的人士。轻松服下サクロン片，还您一个舒爽的胃。

效能或效果

用法及用量

成分

注意事项

包装及价格

效能或效果



烧心、饮酒过量、胃痛、胃酸过多、胃胀、胃部不适感、胃部胀满感、胃重、胸闷、打嗝、恶心（想吐、反胃、宿醉・醉酒想吐、作吐、恶心）、呕吐

用法及用量

请在餐间及睡前空腹时用水或温水服用下述量。

年龄	1次剂量	服用次数
成人（15岁以上）	4片	1日3次
8岁以上15岁未满	2片	1日3次
未满8岁	请勿服用	-

※餐间是指进餐后2个小时左右，胃内几乎没有食物时。

用法及用量相关注意

儿童（8岁以上未满15岁）请在监护人指导监督下服用。

成分

成分及作用

成人1日量12片中含有下述成分。

成分	含量	药理作用
叶绿素铜钾	120毫克	修复及保护损伤的胃粘膜。
无水磷酸氢钙	1,020毫克	直接中和分泌过量的胃酸。
沉淀碳酸钙	1,020毫克	直接中和分泌过量的胃酸。
氢氧化镁	960毫克	直接中和分泌过量的胃酸。
莨菪提取物	30毫克	抑制胃酸分泌，止痛。

添加剂

玉米淀粉、羟丙基纤维素、L-薄荷醇、香料、氯化钾、肉桂、硬脂酸镁、聚维酮

成分相关注意事项

1. 服用后，粪便可能会变成绿色，这是叶绿素铜钾（绿色）被排泄引起的着色，请不必担心。
2. サクロン片中未使用含铝的成分。

注意事项

▲ 使用注意事项

禁止事项

若不遵守则会导致当前病情恶化，或容易出现副作用及事故

1. 在服用本药剂期间，请不要服用下述医药品。
胃肠镇痛解痉药
2. 处于哺乳期时不要服用本药剂，或在服用本药剂时不要进行哺乳。
（转移到母乳可能会导致婴儿的脉搏加快）

咨询事项

1. 以下人群在服用前应咨询医师，药剂师或登录贩卖者。

1. 正在接受医师治疗的人群
 2. 孕妇或有其可能性的人群
 3. 老年人
 4. 因药物等出现过过敏症状的人群
 5. 拥有以下症状的人群
排尿困难
 6. 接受以下诊断的人群
肾病、心脏病、青光眼、甲状腺功能障碍
2. 服用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时应立即中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者

相关部位	症状
皮肤	起疹・发红、发痒

3. 服用后可能出现下述症状，若症状持续或加重时应立即停止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者。

口腔干燥、便秘、腹泻

4. 若使用两周左右后症状仍无改善则应中止使用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者

其他注意事项

可能导致难以产生母乳。

保管及使用注意事项

1. 请密封保管在避免阳光直射的干燥阴凉场所。
2. 请保管在儿童无法触及的地方。
3. 请不要移至其他容器中。此外，请不要将其他药剂放入本容器中。（会导致误服或变质。）
4. 4片装小袋包装产品，请注意以下事项。
如需服用1包分服后剩余药物时，请将袋口折叠进行保管，当超过2天后请勿服用。
5. 96片包装，请注意以下事项。
 1. 容器内的填充物用于防止运输中的片剂破损。开封后请扔掉填充物。请将容器密封保存。
 2. 从质量保证的角度出发，即使在使用期限内，一旦开封后请以在6个月内使用为准。请在盒内盖的“开封年月日”一栏填写开封日期。
6. 请勿使用超过使用期限的产品。

包装及价格

包装	建议零售价
40片	含税：1,078日元（不含税：980日元）
96片	含税：2,134日元（不含税：1,940日元）