

本製品は日本国法に基づき製造販売されたものです。
製品および文書は日本国外の法規に準じているわけではありません。
本文書は、日本語の製品情報を翻訳した文書です。使用前に必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。
由于本产品是根据日本国家法律所制造销售的产品，因此产品和文件内容不一定会遵守日本国以外的法律法规。
本文件是将日文的产品信息翻译成中文以供您参考，使用前请务必阅读。
同时，应进行妥善保管，以方便在必要时随时取阅。



第三类医药品

祛除口臭，缓解宿醉

サクロフィール錠

Saclophyl Tablets

“サクロフィール錠”含有源自叶绿素的绿色成分，可作用于致臭物质，祛除口臭。



包装	建议零售价（含税）
12片	356 日元
50片	1,058 日元

效能或效果

祛除口臭，缓解宿醉

用法及用量

请按以下剂量用水或温开水服用：

年龄	1次剂量	服用次数
成人（15岁以上）	3~4片	1天 1~3次
儿童（小于15岁）	不要服用	

〈取出片剂的方法〉

使用“12片包装”时，请用指尖用力按压装有药片的药板突出部分，并挤破背面的铝箔后取出药片服用。（如不慎将药片板一起服下，将会引起扎入食道粘膜等意外事故。）

成分和药理作用

每片含有以下成分：

成分	含量	药理作用
叶绿素铜钠	15 毫克	可作用于体内的致臭物质，祛除口臭。

〈添加物〉

玉米淀粉、dl-薄荷醇、硅酸镁、硬脂酸钙、白糖

〈成分相关注意事项〉

1. 服用后，舌头表面变绿是由于叶绿酸铜钠的着色引起，会随着时间的推移而逐渐消失。
2. 服用后，可能会出现便色变绿或便臭减轻的情况，但无需担心，这是由于叶绿酸铜钠着色及除臭作用的缘故。



使用注意事项

咨询事项

1. 以下人群请在服用前咨询医师、药剂师或登录贩卖者：
正在接受医师治疗的人群
2. 服用后可能会出现下述症状，若症状持续或加重时请中止服用，并携带此盒咨询医师、药剂师或登录贩卖者：
软便

其他注意事项

如果是因疾病引起口臭，请就医治疗疾病。

保管及使用注意事项

1. 请（密封）保管在避免阳光直射的干燥阴凉处。（ ）记载在 50 片包装中。
2. 请保管在儿童无法触及的地方。
3. 请勿移至其他容器中。此外，请勿装其他药物在本容器内。（会导致误用或变质）
4. 请勿使用超过使用期限的产品。
5. 50 片包装请注意以下事项：
容器内的充填物用于防止运输过程中药片的破损，开盖后请将其扔掉。此外，请密封保管好容器。

咨询服务：如对本品有不清楚之处，请填写咨询表。依据咨询内容等，可能需要一些时间处理，但我们会尽力迅速回复您。

咨询表（仅有英文版）：https://inquiry.eisai.co.jp/webapp/form/17672_sdab_2/index.do