

new selbelle tablets premium

# 新セルベール整胃プレミアム<錠>

第2類醫藥品



< セルベールブランド情報

製品詳細・添付文書

+

• overview

## 產品概要

### 新セルベール<sup>®</sup>整胃プレミアム<錠>



用於因腹脹、進食過量而引致虛弱胃部的胃藥

守護胃部的胃黏液會隨著年齡的增長而減少，因此容易引致腹脹等。

新セルベール整胃プレミアム<錠> 配製與醫療用途相同的分量，含有增加胃黏液、守護胃部的成分「替普瑞酮」及激活胃部的「天然藥材」、「消化酵素」，守護變得虛弱的胃部，恢復胃部健康。

新セルベール整胃プレミアム<錠> 是能夠支援您的飲食人生100年的胃藥恢復本來的胃部健康，讓您與家人及友人一起享受美食佳餚的幸福時光。

推薦給最近感到胃部虛弱的人。

- 餐後感到腹脹的情況變多的人
- 吃了小量就感到進食過量的人
- 最近總是感到腹脹的人
- 胃部功能遲緩，感到食物殘留於胃部的人
- 變得不太能吃油膩食物的人

新セルベール整胃プレミアム<錠> 有三重功效，改善腹脹等胃部虛弱症狀。

- 守護→增加附於胃黏膜表面的屏障「胃黏液」，守護胃部。
- 激活→激活胃部運動。
- 消化→分解脂肪，提高消化力。

新セルベール整胃プレミアム<錠> 1次1錠就有效，容易服用。守護胃部，恢復胃部健康的『整胃<sup>®</sup>』功效，讓胃部變得輕鬆。

## 療效或效果



腹脹、進食過量、食欲不振、胃部及腹部膨脹感、胸口灼熱、飲酒過量、噁心（想吐、作嘔、噁心）、嘔吐、胸悶

## 用法及用量

請於餐後將下列的量用水或溫水服用。

年齡	1次用量	服用次數
成人（15歲以上）	1錠	1天3次
兒童（未滿15歲）	請勿服用	-

## 成分

### 成分及主要作用

成人1天分量3錠中含有下列成分。

成分	含量	主要作用
替普瑞酮	150mg	增加胃黏液防止因進食及胃酸刺激胃部。
乾燥蒼朮萃取物（蒼朮原料）	150mg（1.5g）	激活減弱了的胃部運動。
乾燥厚朴萃取物（厚朴原料）	83.4mg（1.0g）	激活減弱了的胃部運動。
解脂酶AP6	14.7mg	幫助消化脂肪－引起腹脹的主要原因。

### 添加劑

滑石粉、維生素E、部分預膠化澱粉、赤蘚糖醇、矽酸鈣、聚維酮

## 注意事項

### ▲ 使用上的注意事項

#### 諮詢事項

1. 下列的人於服用前請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。

1. 正接受醫師治療的人
2. 孕婦或可能懷孕的人
3. 年長者

4. 曾因藥品等，引發過敏症狀的人
  5. 接受過下列診斷的人  
肝臟病
2. 服用後，出現下列症狀的情況下，有可能是副作用，請立刻停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。

相關部位	症狀
皮膚	發疹、發紅、發癢
消化器官	腹部膨脹感、噁心、腹痛
精神神經系統	頭痛
其他	皮下出血

極少可能引發下列嚴重症狀。該情況下，請立刻接受醫師的診療。

症狀名稱	症狀
肝功能障礙	出現發燒、發癢、發疹、黃疸（皮膚和眼白變黃）、褐色尿、全身倦怠、食欲不振等。

3. 服用後，可能出現下列症狀，這種症狀持續或變嚴重的情況下，請停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。

便秘、腹瀉、口乾

4. 即使服用2週左右，症狀也沒有改善的情況下，請停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。

#### 保管及使用上的注意事項

1. 請保管於陽光直射不到、濕氣少的陰涼處，並蓋緊容器然後保管。
2. 請保管於兒童拿不到的地方。
3. 請勿換裝於其他容器。而且，請勿在本容器內放入其他藥劑。（可能導致誤用或變質。）
  - 換裝於塑膠盒等容器，可能會影響產品及容器的品質。
4. 濕氣可能會改變錠劑的外觀，請勿以沾濕的手碰觸。
5. 容器內的填充物是為防止錠劑於運送途中破損。開封後請將此填充物取出丟棄。
6. 請勿服用超過使用期限的產品。
7. 若於使用期限內打開容器瓶蓋，請在大約6個月內使用完畢，以確保品質。請於外盒內蓋的「開封年月日」欄內記錄開封日期。

#### 包裝及價格

包裝	建議零售價
18錠	含稅：1,045日圓（不含稅：950日圓）
36錠	含稅：1,980日圓（不含稅：1,800日圓）
72錠	含稅：2,970日圓（不含稅：2,700日圓）