

travelmin 1

# トラベルミン1 (大人用)

第2類医薬品



<

トラベルミンブランド情報

製品詳細・添付文書

+

overview

## 産品概要

### トラベルミン<sup>®</sup>1

#### 預防及舒緩暈車

- トラベルミン 1, 1天1次服用1錠就有效。協助您一整天享受旅程及舒適地乘坐交通工具。
- 就如彈珠汽水般能迅速溶化崩解, 在旅行中乘搭遊覽車或火車等, 行駛期間不需要水也能服用。
- 即使在暈車後才服用亦能發揮功效。有效預防及控制因暈車而引起的噁心及頭暈。

療效或效果

用法及用量

成分

注意事項

包裝及價格

#### 療效或效果



預防及舒緩因暈車而引起的頭暈、噁心及頭痛。

#### 用法及用量

請將下列1次量1天1次嚼碎或者溶於口中服用。要預防暈車, 請於搭車或搭船30分鐘前服用。

| 年齡    | 1次用量 | 服用次數 |
|-------|------|------|
| 15歲以上 | 1錠   | 1次   |
| 未滿15歲 | 請勿服用 | -    |

#### 成分

## 成分與主要作用

1錠中含有下列成分

| 成分            | 含量     | 主要作用                 |
|---------------|--------|----------------------|
| Meclizine HCl | 50mg   | 抑制自律神經系統及嘔吐中樞異常興奮的情況 |
| 氫溴酸東莨菪鹼       | 0.25mg | 減輕因交通工具而引起的知覺混亂      |

## 添加劑

紅藻膠、玉米澱粉、D-甘露醇、L-薄荷醇、香料、氧化鐵、聚二甲矽烷、甜菊葉提取物、纖維素、聚乙烯吡咯烷酮、無水矽酸

## 注意事項

### ▲ 使用上的注意事項

#### 禁止事項

若不遵守，現在的症狀會惡化，或者容易引發副作用、意外

1. 服用本藥劑的期間，請勿服用下列任何一種醫藥品。

其他暈車藥、感冒藥、解熱鎮痛藥、鎮靜藥、鎮咳祛痰藥、胃腸鎮痛鎮痙藥、含有抗組織胺劑的內服藥等（鼻炎用內服藥、過敏用藥等）

2. 服用後，請勿駕駛操作交通工具或機械類。

（可能出現嗜睡、視力模糊和異常目眩等症狀。）

#### 諮詢事項

1. 下列的人於服用前，請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。

- 正在接受醫師治療的人
- 孕婦或可能懷孕的人
- 年長者
- 曾因藥品等，引發過敏症狀的人
- 有下列症狀的人  
排尿困難
- 曾接受過下列診斷的人  
青光眼、心臟病

2. 服用後，出現下列症狀的情況下，有可能是副作用，請立刻停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。

| 相關部位   | 症狀       |
|--------|----------|
| 皮膚     | 發疹、發紅、發癢 |
| 精神神經系統 | 頭痛       |
| 泌尿器官   | 排尿困難     |
| 其他     | 臉發燙、異常目眩 |

3. 服用後，可能出現下列症狀，這種症狀持續或變嚴重的情況下，請停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。

口乾、便秘、嗜睡、視力模糊

#### 保管及使用上的注意事項

- 請保管於陽光直射不到、濕氣少的陰涼處。
- 請保管於兒童拿不到的地方。
- 請勿換裝於其他容器。而且，請勿在本容器內放入其他藥劑。（可能導致誤用或變質。）

4. 請勿服用已超過使用期限的產品。

#### 包裝及價格

| 包裝 | 建議零售價               |
|----|---------------------|
| 3錠 | 含稅：923日圓（不含稅：839日圓） |