

travelmin 1

# トラベルミン1 (大人用)

第2类医薬品



トラベルミンブランド情報

製品詳細・添付文書

overview

## 产品概要

### トラベルミン<sup>®</sup>1

#### 预防和缓解晕车症状

- トラベルミン1 毎日服用1次即可起效，可助您一天愉快地旅行，轻松地移动。
- 是像汽水软糖一样融化的速溶型片剂。在乘坐飞机、汽车、轮船等移动时即使不用水也可以服用。
- 药物中配合的有效成分即使是在晕车后也能服用。除了有预防作用还能缓解因晕车所引起的恶心及头晕的症状。

效能或效果

用法及用量

成分

注意事项

包装及价格

#### 效能或效果



预防及缓和因晕车引起的头晕、恶心、头疼

#### 用法及用量

请1天1次咀嚼或放入口中溶解服用以下的一次的量。但是为预防晕车，请在乘坐车船前30分钟前服用。

年齢	1次剂量	服用次数
15岁以上	1片	1次
15岁未満	请不要服用	-

#### 成分

## 成分和作用

1片中含有下述成分

成分	含量	药理作用
盐酸美克利嗪	50毫克	抑制自主神经，呕吐中枢的异常兴奋
东莨菪碱氢溴酸盐水合物	0.25毫克	减轻因乘坐交通工具而产生的感觉混乱

## 添加剂

卡拉胶、玉米淀粉、D-甘露醇、L-薄荷醇、香料、氧化铁、二甲基聚硅氧烷、甜叶菊纯化提取物、纤维素、聚维酮、二氧化硅

## 注意事项

### ▲ 使用注意事项

#### 禁止事项

若不遵守则会导致当前病情恶化，或容易出现副作用及事故

1. 在服用本药剂期间，请不要服用下述任何医药品。  
其他晕车药、感冒药、解热镇痛药、镇静药、镇咳祛痰药、胃肠镇痛解痉药，含抗组胺剂的内服药等（鼻炎用内服药、抗过敏药等）
2. 服用后请不要驾驶交通工具或操作机械类。  
(会出现嗜睡，视线模糊或异常眩光等症状。)

#### 咨询事项

1. 以下人群在服用前应咨询医师，药剂师或登录贩卖者。
  1. 正在接受医师治疗的人群
  2. 孕妇或有其可能性的人群
  3. 老年人
  4. 因药物等出现过过敏症状的人群
  5. 拥有以下症状的人群  
排尿困难
  6. 接受以下诊断的人群  
青光眼，心脏病
2. 服用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时应立即停止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者。

相关部位	症状
皮肤	起疹・发红、发痒
精神神经系统	头疼
泌尿系统	排尿困难
其他	脸部灼热、异常眩光

3. 服用后可能出现下述症状，若症状持续或加重时应立即停止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者。

口腔干燥、便秘、嗜睡、视线模糊

## 保管及使用注意事项

1. 请保管在避免阳光直射，干燥阴凉的场所。
2. 请保管在儿童无法触及的地方。
3. 请不要移至其他容器中。此外，请不要将其他药剂放入本容器中。（会导致误服或变质。）
4. 请勿使用超过使用期限的产品。

## 包装及价格

包装	建议零售价
3片	含税:923日元 (不含税:839日元)