

乗りもの酔いの予防と緩和に

トラベルミン® チュロップ。酔ってからでも効く ぶどう味

くだりさ
い



5才以上から大人の方まで服用



6錠(1錠×6包)

第2類医薬品



製造 高市製薬株式会社
販売元 奈良県高市郡明日香村野口10

発売元 エーザイ株式会社
東京都文京区小石川4-6-10

■ 本品に関する
お問い合わせは、
エーザイ
[tictacホットライン]へ
0120-161-454
eisai.jp

使用期限
(西暦 年 月)

製造番号



A4

第2類医薬品

販売名トラベルミン チュロップぶどう味

ノンシュガー

△ 使用上の注意

【してはいけないこと】守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる

①本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。他の乗物酔い薬、カゼ薬、解熱鎮痛薬、鎮咳祛痰薬、胃腸薬・胃腸症・抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、アレルギー用薬等）②服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。（眠気や目のさぬみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。）

③次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

（1）医師の治療を受けている人（2）妊娠又は妊娠していると思われる人

（3）高齢者（4）薬などによりアレルギー反応を起こしたことがある人

（5）排尿困難のある人（6）緑内障、心臓病の診断を受けた人（7）この症状持続して医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
【皮膚】発疹、発赤、かゆみ（精神神経科）頭痛（泌尿器科）排尿困難

【その他の】頭のぼり、異常なまぶしさ、まれに次の重篤な症状が現れることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。（再生不良性貧血）青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が赤くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりにくうとする、山田山があるわるい。

【無類球症】突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。④服用後、次の症状があらわれる

ことがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この箱を持っていたら、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。□の口かき、便器、眠気、目のさぬみ

■ 効能・効果

乗物酔いによるめまい・吐き気・頭痛の予防及び緩和

■ 用法・用量

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
15才以上	2錠	1 回以上の間隔をおいて
11才～14才	1錠	2回まで
5才～10才	1錠	
5才未満	×服用しないこと	

【用法・用量に関する注意】●小児(5~14才)に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。修学旅行などに持たせる場合には、事前に用法・用量など、服用方法をよく指導してください。【ご注意】●本剤はかむか、口中で溶かして服用する薬剤です。かみにくい場合は、齒を傷めることなどのないように、溶かして服用してください。また、誤って喉につまらせないよう十分に注意してください。●服用する時は1錠ずつし、1度に2錠を口中に入れないでください。

■ 成分:1回量(11才以上) 2錠中

d-クルコフニラミンマレイン酸塩 1.33mg
スコボラミン臭化水素酸塩水和物 0.166mg

添加物として、エタノール、クエン酸、
プロピレングリコール、メントール、
香料、アセスルフルムK、イソマル、
グリセリン脂肪酸エチル、
銅クロロフィリンNaを含有

■ 保管及び取扱い上の注意

①直射日光の当たらない温湿度の
少ない涼しい所に保管してください。

②小児の手の届かない所に
保管してください。③他の容器に
入れ替えないでください。(誤飲の
原因になったり品質が変わります。)

④使用期限をすぎた製品は使用
しないでください。

副作用被害救済制度の問合せ先

(独)医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

MOTION SICKNESS REMEDY

Travelmin®Churop
Grape Flavor

(For 5 or more years old)

JAN バーコード