

travelmin cherop grape

トラベルミン チュロップぶどう味 (品牌：トラベルミン チュロップぶどう味)



第2类医药品

<

トラベルミンブランド情報

製品詳細・添付文書

+

overview

产品概要

トラベルミン® チュロップぶどう味

品牌：トラベルミン チュロップぶどう味

预防和缓解晕车症状

トラベルミン チュロップぶどう味能够预防和缓解因晕车引起的头晕/恶心等症状，让旅行和出行变得轻松愉快。便于儿童服用的糖丸型制剂，即使在出发前匆忙时或身体不适时，也可以马上服用。

效能或效果

用法及用量

成分

注意事项

包装及价格

效能或效果



预防和缓解因晕车引起的头晕/恶心/头疼

用法及用量

为预防晕车，请在乘坐车船前30分钟，咀嚼或放入口中溶解服用以下一次的量。

年齢	1次剂量	服用次数
15以上岁	2片	间隔4小时以上，最多服用2次
11岁~14岁	2片	间隔4小时以上，最多服用2次
5岁~10岁	1片	间隔4小时以上，最多服用2次
5岁	请不要服用	-

同时，如果需要追加服用，每次服用需间隔4小时以上。1天的服用次数不可超过2次。

用法及用量相关注意事项

儿童（5~14岁）请在监护人指导监督下服用。如需在修学旅行时服用，请事先好好指导用法、用量等服用方法。

注意

- 难以咀嚼时，请将药剂溶解之后再服用以免损伤牙齿。服用时请充分注意，避免药剂堵住咽喉。本品是咀嚼或在口中溶解后服用的药剂。
- 请1次服用1片，不要将2片药同时放入口中。

成分

成分和作用

1次的量（11岁以上）2片中含有下述成分

成分	含量	药理作用
d-氯苯那敏马来酸酯	1.33毫克	作用于自主神经系统，预防、缓解晕车症状。
东莨菪碱氢溴酸盐	0.166毫克	减轻因乘坐交通工具而产生的感觉混乱。

添加剂

乙醇，柠檬酸，丙二醇，l-薄荷醇，香料，乙酰磺胺酸钾，异麦芽酮糖醇，甘油脂肪酸酯，叶绿素铜钠

注意事项

▲ 使用注意事项

禁止事项

若不遵守则会导致当前病情恶化，或容易出现副作用及事故

1. 在服用本药剂期间，请勿服用下述任何医药品。
其他晕车药、感冒药、解热镇痛药、镇静药、镇咳祛痰药、肠胃镇痛镇痉药、含抗组胺剂的内服药等（鼻炎用内服药、抗过敏药等）
2. 服用后不要驾驶交通工具或操作机械类。（会出现嗜睡，视线模糊或异常眩光等症状）

咨询事项

1. 以下人群在服用前应咨询医师，药剂师或登录贩卖者。
 1. 正在接受医师治疗的人群
 2. 孕妇或有怀孕可能性的人群
 3. 老年人
 4. 因药物等出现过过敏症状的人群
 5. 排尿困难的人群
 6. 接受过青光眼，心脏病诊断的人群
2. 服用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时应立即中止服用，并携带本药盒咨询医师、药剂师或登录贩卖者。

相关部位	症状
皮肤	起疹/发红/发痒
精神神经系统	头疼
泌尿系统	排尿困难
其他	脸部灼热，异常眩光

偶尔出现下述严重症状。此时请立即就医。

症状名称	症状
再生障碍性贫血	出现淤青、鼻血、牙龈出血、发烧、皮肤或粘膜发白、疲劳感、心悸、气短、身体不适难以站稳，血尿等症状。
粒细胞缺乏症	出现突发高烧、发冷、咽喉疼痛等症状。

3. 服用后可能出现下述症状，若症状持续或加重时应中止服用，并携带本药盒咨询医师、药剂师或登录贩卖者。

口腔干燥，便秘，嗜睡，视线模糊

保管及使用注意事项

1. 请保管在避免阳光直射，干燥阴凉的场所。
2. 请保管在儿童无法触及的地方。
3. 请不要移至其他容器中（会导致误用或变质。）
4. 请勿使用超过使用期限的产品。

包装及价格

包装	建议零售价
6片	含税:521日元（不含税：474日元）