

travelmin cherop lemon

トラベルミン チュロップレモン味 (品牌：トラベルミン チュロップレモン味)



第2類醫藥品

<

トラベルミンブランド情報

製品詳細・添付文書

+

overview

產品概要

トラベルミン® チュロップレモン味

品牌：トラベルミン チュロップレモン味

預防及舒緩暈車

トラベルミン チュロップレモン味，有效緩和及預防因暈車而引起的頭暈、噁心等症狀，能令您在旅行及出門時舒適愉快。這是兒童容易服用的口含型暈車藥，在出發前緊張或不適的情況下，亦可立刻服用。

療效或效果

用法及用量

成分

注意事項

包裝及價格

療效或效果



預防及舒緩因暈車而引起的頭暈、噁心及頭痛。

用法及用量

要預防暈車，請於搭車或搭船30分鐘前，將下列1次量嚼碎或者溶於口中服用。

年齡	1次用量	服用次數
15歲以上	2錠	相隔4小時以上，最多2次。
11歲～14歲	2錠	相隔4小時以上，最多2次。
5歲～10歲	1錠	相隔4小時以上，最多2次。
未滿5歲	請勿服用	-

此外，追加服用的情況下，請相隔4小時以上服用1次量。1天的服用次數為最多服用2次。

用法及用量相關的注意事項

使兒童（5歲～14歲）服用的情況下，請在家長的指導監督下使其服用。在學校旅行等讓其攜帶的情況下，請於事前詳細指導用法、用量及服用方法等。

請注意

- 本藥劑是可嚼碎，或者溶於口中服用的藥劑。在難於嚼碎的情況下，為免弄傷牙齒，請溶於口中才服用。請多加注意，以免藥劑卡在喉嚨。
- 請每次1錠服用，勿同時將2錠放進口中。

成分

成分及主要作用

1次量(11歲以上)2錠中含有下列成分。

成分	含量	主要作用
d-縮水蘋果酸氯菲尼拉明	1.33mg	抑制自律神經系統，緩和及預防暈車症狀。
氫溴酸東莨菪鹼	0.166mg	減輕因交通工具而引起的知覺混亂。

添加劑

檸檬酸、l-薄荷醇、香料、安賽蜜、異麥芽酮糖醇、脂肪酸甘油酯、維生素B₂

注意事項

▲ 使用上的注意事項

禁止事項

若不遵守，現在的症狀會惡化，或者容易引發副作用、意外

1. 服用本藥劑的期間，請勿服用下列任何一種醫藥品。

其他暈車藥、感冒藥、解熱鎮痛藥、鎮靜藥、鎮咳祛痰藥、胃腸鎮痛鎮痙藥、含有抗組織胺劑的內服藥等（鼻炎用內服藥、過敏用藥等）

2. 服用後，請勿駕駛操作交通工具或機械類。（可能出現嗜睡、視力模糊和異常目眩等症狀。）

諮詢事項

1. 下列的人於服用前，請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。

1. 正在接受醫師治療的人
2. 孕婦或可能懷孕的人
3. 年長者
4. 曾因藥品等，引發過敏症狀的人
5. 有排尿困難的人
6. 曾接受過青光眼、心臟病診斷的人

2. 服用後，出現下列症狀的情況下，有可能是副作用，請立刻停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。

相關部位	症狀
皮膚	發疹、發紅、發癢
精神神經系統	頭痛
泌尿器官	排尿困難
其他	臉發燙、異常目眩

極少可能引發下列嚴重症狀。該情況下，請立刻接受醫師的診療。

症狀名稱	症狀
再生不良性貧血	出現瘀青、流鼻血、牙齦出血、發燒、皮膚和黏膜看起來蒼白、疲勞感、心悸、氣短、身體不適，暈眩、血尿等。
無顆粒性白血球症	出現突然發高燒、發冷、喉嚨痛等。

3. 服用後，可能出現下列症狀，這種症狀持續或變嚴重的情況下，請停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。

口乾、便秘、嗜睡、視力模糊

保管及使用上的注意事項

1. 請保管於陽光直射不到、濕氣少的陰涼處。
2. 請保管於兒童拿不到的地方。
3. 請勿換裝於其他容器。（可能導致誤用或變質。）
4. 請勿服用已超過使用期限的產品。

包裝及價格

包裝	建議零售價
6錠	含稅：521日圓（不含稅：474日圓）