

travelmin family

トラベルミン ファミリー

第2類医薬品



<

トラベルミンブランド情報

製品詳細・添付文書

+

overview

産品概要

トラベルミンファミリー

予防及舒緩暈車

トラベルミン ファミリー，是有效預防及舒緩暈車症狀的暈車藥。
トラベルミン ファミリー就如彈珠汽水般能迅速溶化崩解，在旅行中乘搭遊覽車或火車等，行駛期間不需要水也能服用。
而且，即使在暈車後才服用亦能發揮功效，讓你能夠享受旅程。
トラベルミン ファミリー從5歲以上的兒童至大人均可服用。

療效或效果

用法及用量

成分

注意事項

包裝及價格

療效或效果



預防及舒緩因暈車而引起的頭暈、噁心及頭痛。

用法及用量

要預防暈車，請於搭車或搭船30分鐘前，將下列1次量嚼碎或者溶於口中服用。

年齡	1次用量	服用次數
成人（15歲以上）	2錠	相隔4小時以上，最多2次
11歲～14歲	2錠	相隔4小時以上，最多2次
5歲～10歲	1錠	相隔4小時以上，最多2次
未滿5歲	請勿服用	-

此外，追加服用的情況下，請相隔4小時以上服用1次量。1天最多服用3次。

用法及用量相關的注意事項

使兒童（5歲～14歲）服用的情況下，請在家長的指導監督下使其服用。在學校旅行等讓其攜帶的情況下，請於事前詳細指導用法、用量及服用方法等。

取出錠劑的方法

請如下圖，用指尖用力按壓放有錠劑的包裝膜凸出部位，將裏面的鋁箔弄破，然後取出錠劑服用。（有可能會引致誤將包裝膜吞服而令食道粘膜刺穿等的事故。）



成分

成分與主要作用

1次分量(11歲以上)2錠中含下列成分。

成分	含量	主要作用
Meclizine HCl	25mg	抑制自律神經系統及嘔吐中樞異常興奮的情況
氫溴酸東莨菪鹼	0.16mg	減輕因交通工具而引起的知覺混亂

添加劑

玉米澱粉、D-甘露醇、L-薄荷醇、香料、氧化鐵、聚二甲矽烷、甜菊葉提取物、纖維素、聚乙烯吡咯烷酮、無水矽酸

注意事項

▲ 使用上的注意事項

禁止事項

若不遵守，現在的症狀會惡化，或者容易引發副作用、意外

1. 服用本藥劑的期間，請勿服用下列任何一種醫藥品。

其他暈車藥、感冒藥、解熱鎮痛藥、鎮靜藥、鎮咳祛痰藥、胃腸鎮痛鎮痙藥、含有抗組織胺劑的內服藥等（鼻炎用內服藥、過敏用藥等）

2. 服用後，請勿駕駛操作交通工具或機械類。

（可能出現嗜睡、視力模糊和異常目眩等症狀。）

諮詢事項

1. 下列的人於服用前，請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。

1. 正在接受醫師治療的人
2. 孕婦或可能懷孕的人
3. 年長者
4. 曾因藥品等，引發過敏症狀的人
5. 有下列症狀的人
排尿困難

6. 曾接受過下列診斷的人

青光眼、心臟病

2. 服用後，出現下列症狀的情況下，有可能是副作用，請立刻停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。

相關部位	症狀
皮膚	發疹、發紅、發癢
精神神經系統	頭痛
泌尿器官	排尿困難
其他	臉發燙、異常目眩

3. 服用後，可能出現下列症狀，這種症狀持續或變嚴重的情況下，請停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。

口乾、便秘、嗜睡、視力模糊

保管及使用上的注意事項

1. 請保管於陽光直射不到、濕氣少的陰涼處。
2. 請保管於兒童拿不到的地方。
3. 請勿換裝於其他容器。而且，請勿在本容器內放入其他藥劑。（可能導致誤用或變質。）
4. 請勿服用已超過使用期限的產品。
5. 若於使用期限內打開內袋（鋁袋），請在大約6個月內使用完畢，以確保品質。請於外盒內蓋的「開封年月日」欄內記錄開封日期。

包裝及價格

包裝	建議零售價
6錠	含稅：880日圓（不含稅：800日圓）