

travelmin family

トラベルミン ファミリー

第2类医薬品



<

トラベルミンブランド情報

製品詳細・添付文書

+

overview

产品概要

トラベルミンファミリー

预防和缓解晕车症状

トラベルミン ファミリー是可以有效预防和缓解晕车症状的晕车药。

トラベルミン ファミリー是像汽水软糖一样融化的速溶型片剂，所以在旅行中乘坐巴士和电车的时候不用水也可以服用。

即使是在晕车之后才服用，药剂中配合的有效成分也可以让您享受旅行乐趣。

トラベルミン ファミリー从5岁以上孩子到成人均可服用。

效能或效果

用法及用量

成分

注意事项

包装及价格

效能或效果



预防及缓和因晕车引起的头晕、恶心、头疼

用法及用量

为预防晕车，请在乘坐车船前30分钟，咀嚼或放入口中溶解服用以下一次的量。

年龄	1次剂量	服用次数
成人（15岁以上）	2片	间隔4小时以上，最多2次
11岁～14岁	2片	间隔4小时以上，最多2次
5岁～10岁	1片	间隔4小时以上，最多2次
未满5岁	请不要服用	-

同时，如需追加服用，每次服用需间隔4小时以上。1天的服用次数不可超过2次。

用法及用量相关注意

儿童（5～14岁）请在监护人指导监督下服用。如需在修学旅行时服用，请事先好好指导用法、用量等服用方法。

如何取出药片

如下图所示，用指尖用力按压装有药片的纸的凸起部分，挤破背面的铝箔，取出药片并将其服用。（如果不小心把纸板也一起吞进去的话，会导致食物粘膜被刺伤等意外的事故。）



成分

成分和作用

1次的量（11岁以上）2片中含有下述成分。

成分	含量	药理作用
盐酸美克利嗪	25毫克	抑制自主神经，呕吐中枢的异常兴奋
东莨菪碱氢溴酸盐水合物	0.16毫克	减轻因乘坐交通工具而产生的感觉混乱

添加剂

玉米淀粉，D-甘露醇，L-薄荷醇，香料，氧化铁，二甲基聚硅氧烷，甜叶菊纯化提取物，纤维素，聚维酮，二氧化硅

注意事项

▲ 使用注意事项

禁止事项

若不遵守则会导致当前病情恶化，或容易出现副作用及事故

1. 在服用本药剂期间，请不要服用下述任何医药品。
其他晕车药、感冒药、解热镇痛药、镇静药、镇咳祛痰药、胃肠镇痛镇痉药，含抗组胺剂的内服药等（鼻炎用内服药、抗过敏药等）
2. 服用后请不要驾驶交通工具或操作机械类。
（会出现嗜睡，视线模糊或异常眩光等症状。）

咨询事项

1. 以下人群在服用前应咨询医师，药剂师或登录贩卖者。
 1. 正在接受医师治疗的人群
 2. 孕妇或有其可能性的人群
 3. 老年人
 4. 因药物等出现过过敏症状的人群
 5. 拥有以下症状的人群
排尿困难
 6. 接受以下诊断的人群
青光眼，心脏病
2. 服用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时应立即停止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者。

相关部位	症状
皮肤	起疹・发红、发痒
精神神经系统	头疼
泌尿系统	排尿困难
其他	脸部灼热、异常眩光

3. 服用后可能出现下述症状，若症状持续或加重时应立即停止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者。

口腔干燥、便秘、嗜睡、视线模糊

保管及使用注意事项

1. 请保管在避免阳光直射，干燥阴凉的场所。
2. 请保管在儿童无法触及的地方。
3. 请不要移至其他容器中。此外，请不要将其他药剂放入本容器中。（会导致误服或变质。）
4. 请勿使用超过使用期限的产品。
5. 从质量保证的角度出发，即使在使用期限内，一旦内袋（铝制袋）开封后以在6个月内使用为准。请在包装盒开封口的“开封年月日”一栏填写开封日期。

包装及价格

包装	建议零售价
6片	含税:880日元 (不含税:800日元)