

travelmin junior

# トラベルミン・ジュニア

第2類医薬品



トラベルミンブランド情報

製品詳細・添付文書

overview

## 産品概要

トラベルミン®ジュニア

### 預防及舒緩暈車

トラベルミン・ジュニア是有效預防及舒緩暈車症狀，適合兒童服用的暈車藥。  
若擔心會暈車，在乘車前30分鐘服用，就能預防暈車症狀。  
即使在暈車的時候服用亦能改善「頭暈」、「噁心」、「頭痛」等的暈車症狀，讓你能夠享受旅程。

療效或效果

用法及用量

成分

注意事項

包裝及價格

### 療效或效果



預防及舒緩因暈車而引起的頭暈、噁心及頭痛。

### 用法及用量

要預防暈車，請於搭車或搭船30分鐘前，將下列的1次量用水或溫水服用。

年齡	1次用量	服用次數
11歲~14歲	2錠	相隔4小時以上，最多3次
5歲~10歲	1錠	相隔4小時以上，最多3次
未滿5歲	請勿服用	-

此外，追加服用的情況下，請相隔4小時以上服用1次量。1天最多服用3次。

## 用法及用量相關的注意事項

使兒童（5歲～14歲）服用的情況下，請在家長的指導監督下使其服用。在學校旅行等讓其攜帶的情況下，請於事前詳細指導用法、用量及服用方法等。

## 取出錠劑的方法

請如下圖，用指尖用力按壓放有錠劑的包裝膜凸出部位，將裏面的鋁箔弄破，然後取出錠劑服用。（有可能會引致誤將包裝膜吞服而令食道粘膜刺穿等的事故。）



## 成分

### 成分與主要作用

1次分量(5歲～10歲)1錠中含下列成分。

成分	含量	主要作用
水楊酸苯海拉明	20mg	抑制自律神經系統，預防及舒緩暈車症狀
Diprophylline	13mg	抑制因搖晃而引起的知覺混亂，預防暈車

### 添加劑

滑石、乳糖、羧甲基纖維素、二氧化鈦、硬脂酸鈣、纖維素、羥丙基甲基纖維素、聚乙二醇、無水矽酸

## 注意事項

### ▲ 使用上的注意事項

雖然本藥劑是供兒童服用，但是於「使用上的注意事項」中亦寫上大人服用時的事項。

### 禁止事項

若不遵守，現在的症狀會惡化，或者容易引發副作用、意外

1. 下列的人請勿服用。

接受過下列診斷的人。

青光眼、前列腺肥大

2. 服用本藥劑的期間，請勿服用下列任何一種醫藥品。

其他暈車藥、感冒藥、解熱鎮痛藥、鎮靜藥、鎮咳祛痰藥、含有抗組織胺劑的內服藥等（鼻炎用內服藥、過敏用藥等）

3. 服用後，請勿駕駛操作交通工具或機械類。

（可能出現嗜睡等。）

4. 正在哺乳的人請勿服用本藥劑，或者服用本藥劑的情況下，請避免哺乳。

### 諮詢事項

1. 下列的人於服用前，請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。

1. 正在接受醫師治療的人

2. 孕婦或可能懷孕的人

3. 曾因藥品等，引發過敏症狀的人

4. 有下列症狀的人  
    排尿困難
  5. 接受過下列診斷的人  
    癲癇、甲狀腺功能障礙
2. 服用後，出現下列症狀的情況下，有可能是副作用，請立刻停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。

相關部位	症狀
皮膚	發疹、發紅、發癢
循環器官	心悸
泌尿器官	排尿困難

3. 服用後，可能出現下列症狀，這種症狀持續或變嚴重的情況下，請停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。

口乾、嗜睡

#### 其他注意事項

請注意服用本藥劑期間，如飲用酒精類飲品，有可能會加強藥物的作用。

#### 保管及使用上的注意事項

1. 請保管於陽光直射不到、濕氣少的陰涼處。
2. 請保管於兒童拿不到的地方。
3. 請勿換裝於其他容器。而且，請勿在本容器內放入其他藥劑。（可能導致誤用或變質。）
4. 請勿服用已超過使用期限的產品。

#### 包裝及價格

包裝	建議零售價
6錠	含稅：528日圓（不含稅：480日圓）